

Avertissements agricoles

Publication périodique

EDITION "GRANDES CULTURES"

ISSN 0757 4029

BULLETIN TECHNIQUE N° 22

13 AOUT 1987

BETTERAVES : Traitez contre les maladies.
TOURNESOL : Fortes attaques de Sclérotinia signalées.
COLZA : Lutte contre les ravageurs à l'automne (fiche en page 3).

- TOURNESOL -

SCLEROTINIA :

● Suite à la période pluvieuse que nous avons connue depuis le 18 Juillet, de nouvelles contaminations de Sclérotinia ont eu lieu.

● Alors que les attaques précoces s'étaient portées sur le bouton floral, les contaminations de Juillet se sont portées sur tiges et les premières casses de tiges sont maintenant visibles.

● Les attaques sont plus ou moins fortes selon l'inoculum de Scléroties présent sur la parcelle (rotation) et la variété de tournesol cultivée. Elles peuvent aller jusqu'à la destruction totale d'une parcelle (cas observé à Nohant en Gracay -18-).

→ Aucune lutte chimique n'est opérante contre cette maladie sur cette culture.

● Les observations faites dans des essais variétaux de G.D.A. montrent des différences sensibles de comportement variétal :

- En plus de Mirasol et Rodéo, variétés déjà très attaquées sur bouton floral, Viki, Upsol-Véraflor et Vitaflor semblent très sensibles au Sclérotinia.

- Par contre, Frankasol, Maryflor, ... sont beaucoup moins attaquées.

→ La seule lutte possible consiste, pour les années à venir, en un choix de variétés tolérantes à cette maladie.

- MAIS DOUX, FLAGEOLETS -

PYRALE :

● Le deuxième vol n'est pas commencé, même en zones précoces.

→ Pas de traitement dans l'immédiat.

- MAIS -

ACARIENS :

● Quelques attaques modérées d'acariens (*Tetranychus urticae*) ont été détectées depuis trois semaines en Petite Beauce du Loiret, dans les secteurs déjà concernés l'an passé. A cette date, les attaques sont moins conséquentes qu'en 1986 et une lutte curative est très aléatoire sur maïs grain.

→ Pas de traitement à envisager.

- BETTERAVES -

MALADIES :

● Les premiers symptômes sont maintenant observables.

Abonnement annuel : 135 F

Cheque à l'ordre du Régisseur de Recettes

à envoyer à l'adresse ci-dessous.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

93, Rue de Curambourg - B.P. 210

45403 FLEURY-LES-AUBRAIS CEDEX - Tél. (38) 86.36.24

ÉDITION DE LA STATION "CENTRE"

(Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret)

Imprimerie de la Station "Centre"

Le Directeur-Gérant A. SIMONIN

CPPAP N 530 AD



P 45

- La Ramulariose est la maladie dominante.
- L'Oïdium est parfois rencontré.
- Quelques pustules de Rouille sont localement visibles.

→ Intervention à réaliser avant le 15 Août avec un produit polyvalent efficace sur les maladies présentes sur la parcelle et impérativement sur Ramulariose.

Reconnaissance des symptômes de maladies : Voir fiche couleur jointe au bulletin N° 21.

Produits : Voir tableau couleur "Principales maladies de la betteraves" jointe au bulletin N° 20 du 23 Juillet.

Erratum : Dans ce tableau "Principales maladies de la betterave", CORVET CM à 2 kg/ha doit figurer en vert foncé dans la colonne "Oïdium".

- COLZA -

IMPLANTATION :

● Pour favoriser les levées de mauvaises herbes avant semis, pratiquer un déchaumage ou une façon profonde dès la récolte de la céréale. Rouler immédiatement pour limiter l'évaporation des réserves en eau.

● Un semis précoce (fin Août-début Septembre) est favorable à une bonne implantation donc à un fort potentiel de la culture. Par contre, il renforce les risques d'attaque par la mouche du chou.

LUTTE CONTRE LES INSECTES A L'AUTOMNE (voir fiche couleur jointe) :

Les ravageurs les plus redoutables dans notre région sont les suivants :

● **La mouche du chou** : Ce ravageur occasionne de fréquentes attaques sur semis précoces levés avant le 5-10 Septembre, et plus spécialement dans le Berry (18, 36) et le Drouais-Thymerais (28).

→ Les seules méthodes de lutte fiables sont la pratique de semis pas trop précoces (après le 5 Septembre) et l'utilisation dans la raie de semis des microgranulés suivants (efficacité limitée si sol sec) : CURATER ou DELEX à 9 à 12 kg/ha - COUNTER PLUS à 10 à 12 kg/ha - DELTANET à 12 kg/ha - ONCOL 5G à 9 à 12 kg/ha.

Les traitements en pulvérisation sur culture en place ne donnent pas de résultats satisfaisants.

● **La grosse altise** : Bien que les deux années passées n'aient pas révélé de grosses pullulations, c'est le ravageur le plus fréquent à l'automne dans notre région. Il peut occasionner des dégâts sur jeunes plantules (morsures d'adultes) ou sur plantes plus développées (larves dans les pétioles).


→ La lutte préventive avec des microgranulés peut être prise en défaut en cas d'attaque très précoce ou de sol sec. Les pulvérisations en végétation à l'aide de pyréthrinoides, en fonction des captures à la cuvette jaune, donnent de très bons résultats.

● **Le charançon du bourgeon terminal** : Ce ravageur n'est présent que dans le Berry (18) et les petites régions limitrophes. Aucune grave attaque n'a été observée depuis 1983, mais cet insecte doit être surveillé.

→ En raison de la date tardive des vols (après la mi-October), les microgranulés dans la raie de semis donnent des résultats insuffisants (manque de rémanence). La meilleure méthode de lutte est l'application en pulvérisation d'un pyréthrinolde lorsqu'un vol se produit.

RAVAGEURS DU COLZA

Cherchez-les au bon moment...




Dessins de A. GRAAUD (Service de la Protection des Végétaux)

... avec la bonne méthode...

Le piégeage ou technique de la cuvette jaune

- **Mise en place des cuvettes** : dès le semis, ou au plus tard à la levée dès les premiers réchauffements ; les installer à 10 mètres de la bordure, du côté d'un ancien champ de colza ; les remplir avec 1 litre d'eau et quelques gouttes de liquide vaisselle. Jusqu'au stade B₂, la cuvette est enterrée, puis elle est placée à 25 cm de hauteur.
- **Attention !** Le fond de la cuvette doit suivre le niveau supérieur de la végétation.



- **Surveillance** : 2 fois par semaine et tous les jours après les premières captures.
- **Insectes capturés** : grosse altise, charançon du bourgeon terminal, gros charançon de la tige, méligèthes, charançon des siliques.

L'observation des plantes

- **Observez 50 plantes** au hasard sur l'ensemble de la parcelle.
- **Insectes** : grosse altise (larve et adulte), puceron cendré du chou, gros charançon de la tige, méligèthes, charançon des siliques.

... et comptez-les

P 46

Avant de traiter, vérifiez si le compte est bon !

Ravageur	Observation des plantes	Piégeage "cuvette jaune"
Limace	dès les premiers dégâts, du semis au stade B2	
Grosse altise adulte	3 pieds/10 avec morsures nutritionnelles, jusqu'au stade B2	20 à 30 captures cumulées après le stade B2
Grosse altise larve	2 plantes/3 attaquées	
Puceron cendré	- automne 1 plante/5 colonisée - de C1 à 3-4 semaines avant la récolte : 2 colonies/m ²	
Charançon du bourgeon terminal		notez les premières captures : intervenez 10 à 15 jours après si le colza est au stade B3
Gros charançon de la tige	1 ponte/plante entre les stades C1 et T20	vous indique les premières arrivées vous pouvez alors aller observer
Meligèthe	- stades boutons accolés à D1 : 1 insecte par inflorescence - stades boutons séparés à E : 2 ou 3 insectes	
Charançon des siliques	à partir des stades G2 G3 : 1 charançon pour 2 pl.	

Les produits de traitement

• Contre les limaces

- appâts empoisonnés sous forme granulée, épandre régulièrement le soir (25 granulés par m²)
- matières actives : mercaptodiméthur (3 à 5 kg/ha selon les spécialités commerciales)
métaldéhyde (5 à 10 kg/ha selon les spécialités commerciales)

• Contre les insectes

Au semis		De la levée à la fin du repos hivernal		Produits utilisables (1)		A partir de la reprise de végétation			
Grosse altise	Charançon du bourgeon terminal	Grosse altise	Charançon du bourgeon terminal	Matières actives	Spécialités commerciales	Charançon de la tige	Meligèthe	Charançon des siliques	Puceron
9 kg				Bentfuracarbe	Oncol 5 G				
9 kg	9 kg			Carbofuran	Curater, Delex				
12 kg				Furathiocarbe	Deltanet				
10 kg				Terbuphos	Counter 2 G				
9 kg				Thiofanox	Dacamox 5 G				
18 kg				Phorate + Terbuphos	Dispell				
		0,15 l 0,1 l		Alphaméthrine	Fastac Fastac 10	0,15 l	0,2 l 0,1 l	0,2 l 0,1 l	
				Bromophos	Nexion 25 - Sovinexion 25 Nexion 40		2 l 1,4 l	2 l	2 l
				Bromophos Méthyl	Nexion EC 40		1,4 l		
		0,3 l	0,3 l	Cyfluthrine	Baythroid	0,3 l	0,2 l		
		0,15 l		Lambda Cyhalothrine	Karate	0,15 l	0,1 l	0,1 l	
		0,25 l 0,5 l		Cyperméthrine	Cymbush, Kafil super Nombreuses spécialités (2)	0,25 l	0,25 l 20 g ma/ha	0,25 l	
		0,2 l		Deltaméthrine	Décis Décis Flow	0,3 l 0,3 l	0,2 l 0,2 l	0,2 l	
				Dialiphos	Torak		1,25 l	1,25 l	
		250 g ma/ha		Endosulfan	Nombreuses spécialités (2)	400 g ma/ha	250 g ma/ha	600 g ma/ha	
		0,5 l		Fenvalérate	Sumicidin 10		0,4 l	0,4 l	
		0,2 l		Fluvalinate	Mavrik		0,2 l		0,2 l
		200 g ma/ha		Lindane	Nombreuses spécialités (2)	300 g ma/ha	200 g ma/ha		
		200 g ma/ha		Lindane huileux	Nombreuses spécialités (2)	300 g ma/ha	200 g ma/ha		
		1,5 l ou 1,5 kg		Malathion	Nombreuses spécialités (2)		1,5 l ou 1,5 kg		
		1,25 kg		Méthidathion	Ultracide 20 bouillie Ultracide 20 liquide	1,5 kg 1,5 l	1,25 kg 1,25 l		
		200 g ma/ha		Parathion Ethyl	Nombreuses spécialités (2)	300 g ma/ha	200 g ma/ha		
		200 g ma/ha		Parathion Méthyl	Nombreuses spécialités (2)	300 g ma/ha	200 g ma/ha		
		200 g ma/ha		Parathion huileux	Nombreuses spécialités (2)	300 g ma/ha	200 g ma/ha		
				Phosalone	Zolone Flo - Azofène Flo Nombreuses spécialités (2)		2 l 1000 g ma/ha	2,5 l 1200 g ma/ha	1,2 l
				Pyrimicarbe	Pirimor G				0,5 kg
		0,75 l		Endosulfan + Parathion - Ethyl	Drifène AP, Ekadrine PE	1,25 l	0,75 l		
				Endosulfan + Thiométon	Serk				1,5 l
		1 l		Lindane + Parathion Ethyl	Sopragam	1,5 l	1 l		
		1,75 l		Lindane + Parathion Méthyl	Paralindex	2,5 l	1,75 l		
		0,75 l 0,75 l		Parathion Méthyl + Phosalone	Fortène Taxylone	1,5 l	0,75 l 0,75 l		

(1) Doses en l ou kg de produit commercial par ha.

(2) La dose de matière active par hectare mentionnée correspond à la dose de matière la plus fréquente. Avant toute utilisation, vérifier la dose de produit commercial autorisée sur l'étiquette.

Liste arrêtée au 1.8.87

S.P.V.